

Les plus de 65 ans

Tétanos

Rappel de dTP (diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) **à 65 ans puis tous les 10 ans**, avec la coqueluche si non fait à l'âge adulte ou contact avec des enfants âgés de moins de 6 mois.

Zona

Le zona est lié à une réactivation du virus varicelle. Le risque augmente pour tous après 65 ans. 1 dose de vaccin est recommandée de **65 à 74 ans**.


Grippe

Le virus de la grippe entraîne des complications qui sont plus fréquentes avec l'âge. La vaccination est recommandée **à partir de 65 ans, tous les ans, si possible avant fin novembre** !

Pneumocoque

Le vaccin est recommandé pour les personnes les plus à risque : diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, maladies du foie, immuno-dépression...

Calendrier vaccinal



Où faire mes vaccins ?

- Chez mon médecin traitant
- Au Centre de Vaccination Publique de l'Hérault, Institut Bouisson Bertrand, Montpellier, cvp34ibb@bouisson-bertrand.fr
Tél. : 04 34 08 73 65

Vaccination : Tous concernés !

Parlez-en à un professionnel de santé : médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier.



Les vaccins sont adaptés à votre situation

Plus d'info. sur www.mesvaccins.net et vaccination-info-service.fr

Réalisation Service Communication : 04 67 33 93 43 (02/20)



Adolescents

■ Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche

Rappel entre 11 et 13 ans.

■ Méningites et septicémies à méningocoque

MéningoC, 1 dose si jamais vacciné dans l'enfance (remboursé) ou MéningoACYW, 1 dose (non remboursé recommandé par Infovac).

■ Infections à Papillomavirus humain (HPV)

Pour tous les jeunes jusqu'à 19 ans et pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans. Schéma : M0,6 de 9 à 14 ans, M0, 2,6 dès 15 ans.

■ Hépatite B

Rattrapage pour tous les adolescents non vaccinés. 2 doses de 20µg à 6 mois d'intervalle entre 11 et 15 ans.

■ ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

2 doses sont nécessaires pour tous afin d'être bien protégés.

■ Varicelle

2 doses de 12 à 18 ans pour ceux n'ayant jamais eu la varicelle.



Adultes

■ Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche

Rappel à 25 (avec coqueluche), 45 et 65 ans, puis tous les 10 ans.

■ Coqueluche

Au moins une fois à l'âge adulte, avec le vaccin dTP,

ET

pour les adultes non vaccinés depuis plus de 10 ans en contact avec des nourrissons âgés de moins de 6 mois (projet de parentalité, entourage de nourrissons et de femmes enceintes).

■ Méningites et septicémies à méningocoque

Pour les adultes jusqu'à **24 ans**, MéningoC, 1 dose si jamais vacciné dans l'enfance (remboursé) ou MéningoACYW, 1 dose (non remboursé recommandé par Infovac).

■ Hépatite B

Pour les adultes non vaccinés et exposés à un risque accru de contamination : parlez-en avec votre médecin.

■ ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

2 doses au total pour ceux **nés après 1980**.

■ Varicelle

2 doses pour les femmes en âge de procréer n'ayant jamais eu la varicelle.

Femmes enceintes

Avant la grossesse, mettez à jour vos vaccins :

■ Coqueluche

Les quintes de toux peuvent provoquer des contractions utérines chez la femme enceinte et l'infection des poumons est parfois mortelle chez le nourrisson.

■ ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)

Les virus de rougeole et rubéole peuvent entraîner des **fausse-couches** et des **malformations**.
2 doses si non fait dans l'enfance.

■ Varicelle

Contractée pendant la grossesse, elle est dangereuse pour la mère et l'enfant. Le vaccin est recommandé pour toutes les femmes n'ayant pas eu la varicelle.

Pendant la grossesse

■ Grippe

Le virus de la grippe est responsable de complications respiratoires graves chez la femme enceinte mais aussi de fausse-couches et d'accouchements prématurés.

Le vaccin ne présente aucun risque pour la grossesse, il est recommandé chez toutes les femmes enceintes, si possible avant la fin novembre !