GASTROSTOMIE

Soins et Surveillances

POST OPÉRATOIRE IMMÉDIAT

• **La première semaine :**

Il est primordial d'évaluer la douleur et de prendre des antalgiques en fonction. Il faut surveiller votre température. N'hésitez pas à nous contacter si les douleurs augmentent ou votre abdomen semble gonflé.

SOIN

• **La première semaine :**

Réalisation du pansement occlusif 1 fois par jour.

Étape 1 : Nettoyage au savon doux et sérum physiologique
Étape 2 : Rinçage au sérum physiologique
Étape 3 : Séchage
Étape 4 : Désinfection antiseptique (Bétadine® ou Chlorhexidine®)
Étape 5 : Séchage

Veiller à ajuster la distance de la collerette si besoin pour qu'elle soit à moins de 0,5cm de la peau.

Il faut éviter la compression de la peau par la collerette, il est possible d'utiliser une compresse stérile si besoin.

Recouvrir avec un pansement.

Il est conseillé de fixer la sonde horizontalement pour éviter d'avoir une traction sur l'orifice.

SOIN

• **La deuxième semaine :**

réaliser le protocole de la première semaine 1 jour sur 2.

À partir du 15ème jour un rendez vous sera fixé pour l'ablation des ancres et la vérification du ballonnet avec l'eau du robinet ou eau pour préparation injectable. L'utilisation de NaCl est proscrite.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

Pour la suite de la prise en charge, vous pouvez ne plus faire de pansement.

La gastrostomie peut rester à l'air sans pansement.

En cas d'écoulement, il est possible de placer une compresse sèche sous la collerette.


Vous pouvez faire le soin d'hygiène sous la douche (eau et savon puis sécher avec une serviette propre l'orifice et la sonde)

Il faudra mobiliser la sonde tous les jours par des mouvements circulaires de va et vient de moins de 5mm.


Il est conseillé toutes les semaines de vérifier le gonflage du ballonnet selon le volume spécifique noté sur la sonde.

Si entre la pose et le 15ème jour, la sonde sort de l'orifice il faut contacter le gastro entérologue en urgence.

À partir du 15ème jour, il faudra placer une tubulure au plus vite dans l'orifice pour éviter la fermeture de l'orifice et contacter le gastro entérologue au plus tôt.



La sonde de gastrostomie



La sonde ou bouton de MIC-KEY



Les ancres

Mise en page - Direction Communication CHU Montpellier - G.Faugier - 11/26