

## Si un traitement n'est pas prescrit

• Le microbe continuera à dormir dans l'organisme et pourra se développer et la maladie risque alors de se déclarer (le plus souvent au cours des deux premières années).

Dans ce cas-là, une surveillance radiographique tous les 6 mois vous sera proposée pendant deux ans.

Si des signes de la maladie apparaissent (fièvre, toux, amaigrissement, sueurs nocturnes, crachats) il faudrait consulter avant d'attendre la date du rendez-vous pour la radiographie.



Fièvre



Toux



Perte de poids

## Contact

A l'hôpital Arnaud de Villeneuve, Département de Pneumologie.

### • L'équipe du CLAT :

**Dr Jérémie CHARRIOT** : Référent de Structure,

**Dr Corinne COVAS** : Praticien contractuel,

**Dr Sarah DUTRON** : Pédiatre,

**Elodie BOUSQUET, Stéphanie JUSTET, Adeline SAGNAT** : Infirmières,

**Sylviane BOULOUYS** : Secrétaire.

- Secrétariat : 04 67 33 60 84
- Télécopie : 04 67 33 22 75
- Mail : [clat@chu-montpellier.fr](mailto:clat@chu-montpellier.fr)

### • Jours d'ouverture :

du lundi au vendredi

9h00 - 12h30

14h00 - 16h00

### Consultations médicales :

mardi et jeudi sur rendez-vous



## Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT)

Référent de Structure :

Dr Jeremy CHARRIOT

# L'Infection tuberculeuse latente



**CHU de Montpellier**

Hôpital Arnaud de Villeneuve


Pôle Coeur-Poumons

371, Avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 Montpellier cedex 5 - [www.chu-montpellier.fr](http://www.chu-montpellier.fr)

CLAT : Tél : 04 67 33 60 84 - Fax : 04 67 33 22 75

[clat@chu-montpellier.fr](mailto:clat@chu-montpellier.fr)



La radiographie est normale vous n'avez pas de maladie, **vous n'êtes pas contagieux.**

Le microbe dort.  
Le médecin peut demander un scanner.

Un traitement peut éviter que la maladie ne se développe.

Ce traitement va durer 3 mois et il n'y a pas d'urgence à le commencer, il sera commencé lorsque vous serez prêt car il nécessite de votre part un engagement à le prendre tous les matins et à faire un suivi médical.

## Ce suivi comprend :

- **Une prise de sang** avant le début du traitement pour voir si votre organisme peut le supporter.  
Il faudra faire un contrôle par prise de sang (un seul tube) après le début du traitement, puis avant chaque consultation mensuelle au CLAT.


- **Une consultation mensuelle** avec le médecin.

La prise de traitement doit être régulière chaque matin, pendant 3 mois. Il s'agit de deux antibiotiques.

Le clat assure le suivi médical et délivre gratuitement le traitement aux personnes n'ayant pas de couverture sociale.



## Le traitement :



1. Prendre les médicaments au réveil, à jeun.
2. Attendre 30 minutes avant de manger.



3. Repas normaux




4. Boire de l'alcool est dangereux !



5. Ne rien manger pendant la nuit.

## Principaux effets secondaires



6. Urines orange

7. Larmes orange

8. La pilule ne protège plus.

- coloration orangée des larmes et des urines ;
- annulation de l'efficacité de la pilule contraceptive ;
- risque de perturbation du bilan hépatique ;
- troubles digestifs au début du traitement ;
- rares éruptions cutanées.

Si ces effets s'intensifient, veuillez contacter le CLAT.