

Et pour les femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes ?

Il n'y a pas de recommandation spécifique, mais la vaccination contre le HPV est encore plus importante qu'en population générale. Prise en charge de 11 à 26 ans.

Et pour les personnes séropositives ?

Les personnes vivant avec le VIH sont plus sensibles aux infections et répondent parfois moins bien à la vaccination.

Il y a des schémas de vaccination spécialement adaptés à votre situation, contre certaines maladies ou pour les mêmes vaccins mais à dose renforcée (hépatite B : M0,1,2,6 à double dose, dTP tous les 10 ans...).


Demandez à vos proches de se vacciner pour vous protéger !

Vaccins supplémentaires recommandés :

- Grippe et Covid
- Pneumocoque
- Zona
- Méningocoques B et ACWY
- Selon facteurs de risque : hépatite A, Mpox

Parlez-en à votre médecin !

Calendrier vaccinal



Où faire mes vaccins ?

- Chez mon médecin traitant ou mon spécialiste
- Chez mon pharmacien, mon infirmière ou ma sage-femme
- Dans un Centre de Vaccination Publique (CVP)
 - A Montpellier : CVP Hérault, Institut Bouisson Bertrand, cvp34ibb@bouisson-bertrand.fr / Tél. : 04 34 08 73 65
 - Au CeGIDD de Montpellier : cegidd@chu-montpellier.fr / Tél. : 04 67 33 69 50
- A Béziers : Centre Vaccination, Caserne St Jacques, centre.vaccination@beziers.fr / Tél. : 04 67 36 81 00

Conception



Promu par



MAJ : 05/2026

Réalisation : Service Communication - CHU Montpellier - 04 67 33 93 43 - G.F.

LGBTQIA+



La vaccination Pourquoi y penser ?

Des vaccins sont recommandés pour les personnes qui **fréquentent les lieux de convivialité ou de rencontre LGBTQIA+** ou qui **souhaitent se rendre à un rassemblement LGBTQIA+***.

** Personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Queers, Intersexes et Asexuelles*

Parlez-en avec votre médecin !

Plus d'infos : www.mesvaccins.net / vaccination-info-service.fr / infovac.fr



■ HEPATITE B

Le virus de l'hépatite B provoque une infection du foie, qui aboutit parfois à une cirrhose ou un cancer au bout de quelques années. On se contamine par le sang et les fluides corporels. C'est une infection sexuellement transmissible très contagieuse.

Recommandations

Pour tous.

Schéma : 3 doses M0,1, 6.
soit au moins 1 mois entre les 2 premières doses
et au moins 5 mois entre les 2 suivantes.

Efficacité


Le vaccin contre l'hépatite B est très efficace (plus de 98 %). La protection est de très longue durée.

Effets indésirables

Dans moins de 10 % des cas : sensibilité au point d'injection, fièvre, douleurs musculaires passagères.

Prise en charge

Par l'assurance maladie.



■ HEPATITE A

Le virus de l'hépatite A infecte le foie. Les personnes se contaminent par la bouche, au contact d'eaux, aliments ou mains souillées ou encore lors de certaines pratiques sexuelles à risque (contact bouche-anus). L'épidémie d'hépatite A de 2017 en Europe, a concerné à 80 % des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Recommandations

Pour tous les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Schéma : 2 doses à au moins 6 mois d'écart.

Efficacité

Le vaccin contre l'hépatite A est très efficace (> 98 %), dès 2 semaines après la 1^{ère} dose, et à vie dès la 2^{ème} dose.

■ MPOX OU VARIOLE DU SINGE

Depuis 2022, des cas ont été signalés en France. La contamination se fait essentiellement par contact avec de la peau ou des muqueuses avec les boutons d'une personne malade, rarement par la salive (gouttelettes) ou via des objets contaminés.

Recommandations

Pour les cas contacts, les HSH et personnes trans avec partenaires multiples et les personnes en situation de prostitution

NB : ces indications peuvent évoluer selon l'épidémie
Schéma : 2 doses J0-J28 (1 dose si vacciné avant 1980), ou 3 doses M0-M1-M2 si immunodépression.
Rappel à 2 ans pour les personnes vaccinées depuis 2022.

■ HPV

Le virus HPV ou Papillomavirus Humain est une infection sexuellement transmissible très répandue responsable de condylomes et de cancers (cancer du col de l'utérus, de l'anus, du pénis et cancers ORL).

Recommandations

Pour tous de 11 à 26 ans

Schéma : M0,6 de 11 à 14 ans, M0,2,6 à partir de 15 ans (minimum 2 mois entre les 2 premières doses, 4 entre les 2 suivantes).

Effets indésirables

Dans 10 à 20 % des cas : sensibilité au point d'injection.
Dans moins de 10 % des cas : fièvre, douleurs musculaires passagères.

Prise en charge

Remboursé de 11 à 26 ans

Dépistage

Le dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis cervico-vaginal est recommandé chez toutes les femmes, vaccinées ou non, y compris chez les FSF*, celui du cancer anal aux HSH* immunodéprimés, par consultation proctologie.

HSH/FSF : Hommes/femmes ayant des relations sexuelles avec les hommes/femmes*